



## BIORVIT INSTANT

Biointegratore a base di vitamina B 1 (tiammina) e vitamina B 3 (acido nicotinico), aminoacidi vegetali, clyne-betaine, acido folico, colina e boro

**Prodotto a Marchio:**



### COMPOSIZIONE:

Azoto (N) organico	1,1 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	10,9 %
BORO (etanolammina)	2 %
VITAMINA B1 (tiammina)	0,1 %
VITAMINA B3 (acido nicotinico)	0,1 %
Complesso aminoacidico	95 %
pH	5,5 - 6

### COMPONENTI

Acido folico, glicin-betaina, citochinine, estratto di *Ascophyllum nodosum*, estratto di erba medica, complesso amminoacidico completo, Boro etanolammina, vitamine del gruppo B.

**CARATTERISTICHE FISICHE:** soluzione concentrata

### DESCRIZIONE:

Bior-vit instant, è un Fisiointegratore che ha proprietà traslativa molto elevata sia radicale che fogliare il suo meccanismo d'azione induce le piante a produrre di più e con qualità superiore garantendo nel periodo di post-raccolta una migliore conservabilità dei frutti. Contiene elementi che incrementano le difese della pianta portandola ad avere una longevità superiore alle altre piante non trattate, rende la pianta più resistente agli sbalzi di temperatura e soprattutto dai ritorni di freddo nel periodo primaverile. Contrasta efficacemente gli effetti negativi della forte salinità sulla fisiologia delle piante da frutto, i contenuti di sodio e cloro sono riportati ai livelli di piante cresciute in assenza di sale, consentendo il corretto assorbimento dei microelementi essenziali.

- OTTIMIZZA LA PRODUZIONE
- OTTIMO ASSORBIMENTO FOGLIARE E RADICALE
- MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE PRODUZIONI
- PROLUNGA LA VITA DELLE PIANTE
- ABBASSA LA SALINITA' NELLA PIANTA

### Applicazioni:



**CONFEZIONI:** 0,250 Kg - 0,500 Kg

## MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE FOGLIARE	DOSE RADICALE	INTERVENTI
Zucchini, Cetriolo, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Anguria, Carciofo	50 / 75 gr/hl	150 gr/1000 <sup>2</sup>	2-3 trattamenti in post-trapianto o alle prime fasi vegetative, continuare con 3-4 trattamenti in pre-fioritura, post-fioritura, ingrossamento frutti ;(anche in miscela agli idrosolubili) Vietata la miscela con formulati rameici
Uva da Tavola Uva da vino	50 / 75 gr/hl		3-4 trattamenti. Applicazione fogliare alla ripresa vegetativa contro le gelate, in pre-fioritura, prechiusura grappolo l'ingrossamento, allungamento rachide e anticipo di maturazione (anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Ciliegio, Melograno, Olivo, Actinidia	50 / 75 gr/hl		3-4 trattamenti. Applicazione in pre-fioritura - in post-fioritura - ad ingrossamento frutti (anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Fragola	50 / 75 gr/hl	150 gr/1000 <sup>2</sup>	5-6 trattamenti. Applicazione fogliare in post-trapianto (dopo il superamento della crisi) e alla ripresa vegetativa trattare ogni 10 giorni( anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Spinacio, Lattuga, Rucola	50 / 75 gr/hl		2-3 trattamenti in post-trapianto o alle prime fasi vegetative - seguire i trattamenti ogni 10 giorni (anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Barbabietola da zucchero, Patata	50 / 75 gr/hl		2-3 trattamenti alle prime fasi vegetative - seguire i trattamenti ogni 10 giorni (anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Riso, Mais	50 / 75 gr/hl		Autunno-vernini (grano, orzo, avena, etc.). Riso, Mais, anche in miscela con fungicidi (tranne il rame) e/o insetticidi (anche con solfuniluree + adesivi specifici). Applicazione fogliare: (1-2 applicazioni).  Frumento e cereali autunno-vernini ad accestimento-levata e a botticella-spigatura. Su riso, a levata e/o a inizio spigatura. Su mais nelle prime fasi e/o successivamente in occasione dei trattamenti contro la piralide.(anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici
Floricole, Ornamentali	50 / 75 gr/hl		2-4 trattamenti Applicazione fogliare in post-trapianto (dopo il superamento della crisi) e alla ripresa vegetativa, trattare ogni 10 giorni( anche in miscela agli idrosolubili). Vietata la miscela con formulati rameici

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo - climatiche.

**AVVERTENZE:** La confezione se parzialmente usata va chiusa ermeticamente, omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto, immagazzinato tra + 5 e 28°C, non presenta problemi di conservazione. Evitare miscele con prodotti a base di zolfo, rame ed oli minerali. Si consiglia comunque di consultare un tecnico di fiducia in caso di miscela con altri prodotti. I trattamenti vanno eseguiti nelle ore più fresche della giornata. In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.

**CONFEZIONI:** 0,250 Kg - 0,500 Kg